

شرایط انجام تست سرطان رحم (پاپ اسمیر) و Xpert®HPV

- آزمایش پاپ اسمیر در زمان قاعدگی، یا زمانی که ترشحات رحمی خیلی زیاد هستند و عفونت خیلی واضحی وجود دارد، صورت نگیرد. این تست باید در فاصله روزهای ۱۸-۱۲ سیکل قاعدگی انجام بشود و بهترین زمان انجام آزمایش حدود روز ۱۵ چرخه قاعدگی می باشد.
- زنانی که خونریزی قاعدگی در آنها بیشتر از حد طبیعی است، باید برنامه ریزی صحیح داشته باشند و با مشورت پزشک، زمان مناسب برای تست را مشخص نمایند.
- قبل از آزمایش پاپ اسمیر، نباید به مدت ۴۸ ساعت نزدیکی صورت گیرد.
- از پمادهای داخل واژن یا دوش واژینال تا ۴۸ ساعت قبل از نمونه گیری استفاده نشود.
- تا ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش، از اسپرم کش یا هر گونه کرم و ژل های مرطوب کننده و ضد خارش استفاده نشود.
- برای آزمایش مجدد باید فاصله زمانی ۸ هفته از نمونه گیری قبل گذشته باشد.